



Dierenkliniek HET LIESVELT

al jaren een begrip!

Nieuwsbrief najaar 2023

Beste veehouders

Voor u ziet u alweer de najaarseditie van onze nieuwsbrief.

Hierin vindt u onder andere nieuws van de praktijk, maar ook informatie over het blauwtongvirus wat momenteel een opmars maakt in Nederland.

Nieuws van de praktijk



Vertrek Gerben Verrips

Vanaf 1 september is Gerben niet meer werkzaam bij ons op de praktijk. We hopen dat we hem goed op weg hebben kunnen helpen in zijn loopbaan als dierenarts en willen hem ontzettend bedanken voor zijn inzet en motivatie het afgelopen jaar!



Verwerpers

Op elk bedrijf komen verwerpers voor. Een belangrijke oorzaak hiervoor kan Brucellose zijn. Dit is een bacteriële ziekte waar ook de mens gevoelig voor is. In alle gevallen van een verwerper is het verplicht om binnen 7 dagen na het verwerpen bloedonderzoek uit te laten voeren. Visite, bloedafname en bloedonderzoek zijn kosteloos.

Pinkengriep

Het najaar is weer gestart. Dat betekent meer kans op pinkengriep bij de kalveren. Vaccineren zorgt voor goede bescherming. **Begin op tijd** om longschade te voorkomen! Wat wij aanbieden:

1 x per week neusenting voor alle kalveren tussen 0-7 dagen (geen visite)

Daarna op 2 weken leeftijd pinkengriep vaccinatie in de spier en 3-4 weken later herhalen. Dan zijn alle dieren 6 maanden lang beschermd.



Dierenkliniek HET LIESVELT

al jaren een begrip!

Nieuwsbrief najaar 2023

Blauwtong

Inmiddels is er op 33 locaties in Nederland blauwtong vastgesteld. De laatste keer dat dit virus werd vastgesteld was in 2009. Het blauwtongvirus komt vooral voor bij schapen en runderen maar ook andere herkauwers kunnen besmet worden. De besmetting vindt plaats door de beet van knutten (vliegjes) die besmet zijn met het virus. Het virus is niet overdraagbaar door direct contact tussen dieren en is ook niet besmettelijk voor mensen.

Ziekteverschijnselen kunnen wisselend zijn, van symptoomloos tot zeer ernstig. Alleen bij dieren die ernstig ziek zijn kleurt de tong blauw. Andere symptomen zijn:

- koorts
- kwijlen
- zwelling van de kop
- ontsteking bij de kroonrand van de hoeven
- niet meer eten
- veel liggen
- met een bolle rug staan

Vooral schapen hebben veel last van de ziekte. De meeste schapen herstellen na enkele weken maar door complicaties zoals slecht eten kunnen dieren toch overlijden.

Er zijn verschillende serotypen van blauwtong. Inmiddels is bekend dat het aangetroffen blauwtongvirus in Nederland serotype 3 betreft. Voor dit type is nog geen vaccin beschikbaar. Om deze reden is het bestrijden van de knutten een noodzaak!



Dierenkliniek HET LIESVELT

al jaren een begrip!

Nieuwsbrief najaar 2023

Bestrijden van knutten ter voorkoming van blauwtong

Niet elk pour on middel is werkzaam!

Wij adviseren om bij de bestrijding van knutten **Spotinor Pour on** te gebruiken.



2.5 liter - € 122,- excl btw

500 ml - € 44.95 excl btw

Een behandeling van 5 ml per schaap is voldoende. Bij lammeren onder de 10 kg is 2.5 ml voldoende. Voor runderen adviseren we om 10 ml te gebruiken. Spotinor werkt 4 tot 6 weken. Het product is niet geregistreerd voor geiten, maar kan hiervoor wel gebruikt worden.

Gezien het aantal aanvragen op dit moment verwachten wij een flinke toeloop op dit middel. We hebben voorraad, maar bestel vooral op tijd!